МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА

Наименование олимпиады школьников: **«Ломоносов»**

Профиль олимпиады: **Физика**

ФИО участника олимпиады: **Афанасьев Арсений Александрович**

Класс: 11

Технический балл: **93**

Дата проведения: **26 февраля 2021 года**

ШИФР РАБОТЫ 4853068

	1	2	3	4	∑
Вопрос	*8*	*10*	*10*	*10*	*93*
Задача	*15*	*15*	*10*	*15*	

Вариант 1. Чистовик. 1.

1.1.1. Вопросы: • Сила трения покоя определ. по закону Кулона-Амонтона ~~и равна~~ $F_{тр\,пок} \leq \mu N$, где μ - коэф. трения о дан. поверхн., а N - сила реакции опоры. Сила трения покоя численно равна силе её вызывающ. при этом вызыв. сила, рави. $F_{тр\,пок.}$ не превышая μN.

• Сила трения скольжения равна μN ($F_{тр\,ск.} = \mu N$), где μ - коэф. трен. о поверхн., а N - сила реакц. опоры.

• Коэффициент трения - физическая величина, определяемая материалом соприкас. поверхностей, показывающая во сколько сила трен. скольжен. больше силы реакции опоры, определ. миним. силу, ~~для выведения~~ котор. нужно приложить к телу, чтобы вывести его из состояния. устойч. равновес. (преодол. $F_{тр.\,покоя}$).

Задача.







1) рассмотр. систему "m+M" в произволь. момент движен.



по ЗСС: $\vec{S}_{абс.} = \vec{S}_{отн.} + \vec{S}_{кл.}$
для "m" т.е. $\vec{a}_{абс} = \vec{a}_{отн} + \vec{a}_{кл}$



Изобразим силы, действ. на "m" относ. клин
т.к. брусок поднял. вверх, то $F_{тр.}$ скольж. направл. против относит. скорости, направл. вниз вдоль клина.



изобр. силы, действ. на клин.
по 3ЗН: $F_{тр.}$ на клин. равна $F_{тр}$ на брус. и напр. в противоп. стор.
N на клин. равна N на брус. и напр. в проти. стор.

Чистовик 2

Т.к. ~~кубик~~ брусок движется по клину без отрыва, то в системе "м+М" N не совершает работу, а из неконсерв. сил работу совершает только $F_{тр}$.

по ЗЭЭ: для сист. "м+М": $A_{тр} = E_{пк} - E_{пн} + E_{кк} - E_{кн}$.

потенц. энергия клина не меняется, т.к. он на одной высоте.

т.е. $A_{тр} = mgh - 0 + \frac{Mv^2}{2} + \frac{mv^2}{2} - \frac{mv_0^2}{2}$.

т.к. на макс. высоту h брусок поднимется, когда в дальнейшем они остановятся относит. клина, т.е. они едут с один. скор.

$A_{тр} = -F_{тр} S_{отн.}$, где $A_{тр} = F_{тр} S_{отн} \cos 180°$, $F_{тр} = \mu N$, $S_{отн} = \frac{h}{\sin\alpha}$

$A_{тр} = -Q \Rightarrow -Q = -F_{тр} S_{отн.} \Rightarrow Q = F_{тр} S_{отн.}$



Пусть брусок, двигаясь на ΔS вверх, тогда $A_{тр_1} = -F_{тр_1} \Delta S$.

а клин на Δl вправо.

$A_{тр_1} = F_{тр_1} S_{отн} \cos(180-\alpha) + F_{тр_1} \Delta l \cos(180-\alpha)$. $A_{тр_2} = F_{тр_2} \Delta l \cos\alpha$.

т.к. $F_{тр_1} = F_{тр_2} = F_{тр}$, NO.

$A_0 = A_{тр_1} + A_{тр_2} = F_{тр_1} \Delta S + F_{тр_2} \Delta l \cos\alpha = F_{тр} (\Delta l \cos\alpha - \Delta S)$

$A_{тр_1} = -F_{тр_1} S_{отн.} - F_{тр_1} \Delta l \cos\alpha$.

$A_0 = A_{тр_1} + A_{тр_2} = -F_{тр_1} S_{отн.} - F_{тр_1} \Delta l \cos\alpha + F_{тр_2} \Delta l \cos\alpha$

т.к. $F_{тр_1} = F_{тр_2} = F_{тр}$, то $A_0 = -F_{тр_1} S_{отн.}$ $A_0 = -Q$ из 3-го сохран. всей энергии

т.е. $-Q = -F_{тр} S_{отн.}$ $Q = F_{тр} S_{отн}$

2ЗН для бруска. Оу: $N - mg\cos\alpha = -m a_{кл} \sin\alpha$.

2ЗН: для клина: Ох: $Ma_{кл} = N\sin\alpha + F_{тр}\cos\alpha$. т.к. $F_{тр} = \mu N$,

~~отпуска~~ то $Ma_{кл} = N\sin\alpha + \mu N\cos\alpha$.

$$a_{кл} = \frac{N(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)}{M}.$$

$$N - mg\cos\alpha = -\frac{m\sin\alpha}{M} N(\sin\alpha + \mu\cos\alpha).$$

$$N + \frac{m}{M}\sin\alpha(\sin\alpha + \mu\cos\alpha) N = mg\cos\alpha.$$

$$N = \frac{mg\cos\alpha}{1 + \frac{m}{M}\sin\alpha(\sin\alpha + \mu\cos\alpha)} = \text{const}.$$

• Пример. постр. изобр. в плоск. зеркале. ЧИСТОВИК II




$\frac{h}{\text{semn}} = \sin\alpha$
$\frac{R}{r} = \sin\alpha$
$F = \frac{kq^2}{r^2}$
$\frac{kqk \cdot h}{(R^2+h^2)\sqrt{R^2+h^2}} = \frac{Eq}{2h^2\sqrt{2h^2}}$
$\frac{R}{r} = \sin\alpha.$
$\frac{h}{r} = \cos\alpha.$
$Q_3 + \frac{kqk \cdot h}{2R^2\sqrt{2}} = \frac{kqk}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4}$
$\beta_2 = 180 - \beta_1 = 180 - \frac{\alpha}{n}$
$\varphi = \alpha_2 \cdot = n\beta_2 \cdot = 180n - \alpha_1$
$180 - \beta_1 - \beta_2 = 180 - \alpha$
$\beta_2 = \alpha - \beta_1$
$\varphi = n\alpha - n\beta_1 = n\alpha - \alpha$
$\beta_1 = \frac{\alpha}{n}$
$0,1 \cdot 0,2 \cdot 10$
Q_3
α_2
β_2

4853068

4853068

$$F_{тр} = \mu N = \mu \cdot \frac{mg\cos\alpha}{1+\frac{m}{M}\sin\alpha(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)}$$

ЧИСТОВИК 3

$$S_{отн.} = \frac{h}{\sin\alpha}$$

Т.е. $Q = F_{тр} S_{отн.} = \mu \frac{mg\cos\alpha}{1+\frac{m}{M}\sin\alpha(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)} \cdot \frac{h}{\sin\alpha}$.

$$Q = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}1 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}{1+\frac{0{,}1}{1}\cdot\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}+\frac{0{,}3\sqrt{3}}{2}\right)} \cdot \frac{0{,}2}{1} = \frac{0{,}12\sqrt{3}}{1+\frac{1\cdot 1}{10\cdot 4}+\frac{0{,}3\sqrt{3}}{10\,2}} =$$

$$= \frac{0{,}12\cdot\sqrt{3}\cdot 40}{40+1+0{,}6\sqrt{3}} = \frac{1{,}2\cdot 4\sqrt{3}}{41+0{,}6\sqrt{3}} = \frac{1{,}2\cdot 4\cdot 1{,}74}{41+\underbrace{0{,}6\cdot 1{,}74}_{\approx 1}} \approx \underbrace{\frac{1{,}74\,0{,}6\cdot 2\cdot 4}{42}}_{\approx 1} \approx \frac{8}{42}$$

$$\approx \frac{4}{21} \approx 0{,}2 \text{ Дж}.$$

Ответ: $Q \approx 0{,}2$ Дж. $= \frac{\mu mg\cos\alpha h}{\left(1+\frac{m}{M}\sin\alpha(\sin\alpha+\mu\cos\alpha)\right)\sin\alpha}$.

2.6.1.



ЧИСТОВИК

1) рассмотр. момент, до соедин. теплот. система в равновес.

по 2ЗН для поршня: Oy: $p_1S - p_0S - Mg = 0$.

т.е. $p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S}$.

~~из уравнен. Менделеев~~

по основ. урав. МКТ: $p_1 = \frac{2}{3} n \bar{E} = \frac{2}{3} n \frac{m_0 \vartheta_{кв}^2}{2}$.

$p_1 = \frac{1}{3} n m_0 \vartheta_{кв1}^2 = \frac{1}{3} \frac{N}{V_1} \frac{M}{N_A} \vartheta_{кв1}^2 =$

$\frac{1}{3} \frac{M}{V} \vartheta_{кв1}^2 = \frac{1}{3} \frac{m}{V_1} \vartheta_{кв1}^2$.

$\frac{\vartheta_{кв2}}{\vartheta_{кв1}} = \alpha$.

p_0

$i = 3$.

$p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S} = \frac{1}{3} \frac{m}{V} \vartheta_{кв1}^2$.

2) Рассмотрим момент. после соедин. теплоты.

по 2ЗН: для поршня Oy: $p_2S - p_0S - Mg = 0$.

$p_2 = p_0 + \frac{Mg}{S}$.

Получается $p_1 = p_0 + \frac{Mg}{S} = p_2$.

по осн. ур. МКТ.

$p_2 = \frac{1}{3} \frac{m}{V_2} \vartheta_{кв2}^2$ т.е. $\frac{1}{3} \frac{m}{V_2} \vartheta_{кв2}^2 = \frac{1}{3} \frac{m}{V_1} \vartheta_{кв1}^2$

т.к. m газа не меняется, то ее можно сокр.

получ. $\frac{\vartheta_{кв2}^2}{V_2} = \frac{\vartheta_{кв1}^2}{V_1}$ $\frac{\vartheta_{кв2}^2}{\vartheta_{кв1}^2} = \frac{V_2}{V_1}$

т.е. $\alpha^2 = \frac{V_2}{V_1} = \frac{\cancel{S} h_2}{\cancel{S} h_1} = \frac{h_2}{h_1}$.

3). рассм. процесс, перехода газа из сост. 1 в 2.

по ЗСЭ: $\Delta Q = U_2 - U_1 + A_{газа}$. т.к. давлен. вещ. = const,

$U_2 = \frac{3}{2} \nu R T_2 = \frac{3}{2} p_2 V_2$ из урав. Менд.-Клапейр. то и давл. газа = const,

$U_1 = \frac{3}{2} \nu R T_1 = \frac{3}{2} p_1 V_1$. $\nu R T_2 = p_2 V_2$. т.е. процесс изобарн.

$\nu R T_1 = p_1 V_1$. и $A_{газа} = p_* S (h_2 - h_1)$

т.к. $p_1 = p_2$, то $U_2 - U_1 = \frac{3}{2} p (V_2 - V_1) = \frac{3}{2} pS (h_2 - h_1)$

получается. $\Delta Q = \frac{3}{2} pS(h_2 - h_1) + pS(h_2 - h_1) + \frac{5}{2} pS(h_2 - h_1)$.

Листовик 5

откуда $h_2 - h_1 = \frac{2\Delta Q}{5pS}$ $\quad h_2 = \frac{2\Delta Q}{5pS} + h_1$.

Подставим в уравнение для α.

$$\alpha^2 = \frac{\frac{2\Delta Q}{5pS} + h_1}{h_1} = \frac{2\Delta Q}{5h_1 pS} + 1.$$

т.е. $\alpha = \sqrt{\frac{2\Delta Q}{5h_1 pS} + 1} = \sqrt{\frac{2 \cdot 126}{5 \cdot 1 \cdot \ldots}}$

$$\alpha = \sqrt{\frac{2\Delta Q}{5h_1 S\left(p_0 + \frac{Mg}{S}\right)} + 1} = \sqrt{\frac{2\Delta Q}{5h_1 (p_0 S + Mg)} + 1} =$$

$$= \sqrt{\frac{2 \cdot 126}{5 \cdot 1 \left(100 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-4} + 4 \cdot 10\right)} + 1} = \sqrt{\frac{2 \cdot 126}{5 \cdot 240} + 1} = \sqrt{\frac{252}{120} + 1} =$$

$$= \sqrt{\frac{21 + 100}{100}} = \sqrt{\frac{121}{100}} = \frac{11}{10} = 1{,}1$$

Ответ: $\alpha = \sqrt{\frac{2\Delta Q}{5h_1(p_0 S + Mg)} + 1} = 1{,}1$.

Вопросы: • Внутрен. энергия термодинам. системы - энергия движения молекул. сист. и энергия взаимод. молекул. сист. между собой. $E_{сист} = E_{кин} + E_{взаимод.}$ для идеальн. газа. $E_{взаимод.}$ пренебрежим. мало, т.е. для идеальн. газа $E_{сист.} = E_{кин.}$

• Внутрен. энергию можно изменить, сообщив системе количество теплоты, а так же совершая механ. работу над системой (~~сжатие~~ уменьшен. и ~~расширение~~ увеличен. объёма сист. и отдав у.) по 1 началу термодинам. $Q_{подв.} = \Delta U + A_{газа}$.

т.е. ΔU может измен. за счёт $Q_{подв.}$ или $A_{газа}$, которая в данном проц. равна $A_{над. газом}$.

3.Б.1.



$q_б = q = -q_к$.

$h = R$.

δ_{max} - ?

$m = 9г$.

(чистовик 6)

1) рассм. начальн. момент времени. система в равновес. => бус. покоится

изобр. силы, действ. на бусинку. т.к. заряд бусинки и кольца противопол. по знаку, то бусинка притян. к кольцу. С силой $F_э$.

по 2 ЗН для бусинки: Oy: $mg + F_э - F_{упр.} = 0$

т.е. $mg + F_э = F_{упр.}$

2) Опишем воздействие кольца на бусинку.



разобьём кольцо на множество маленьк. участков длин. $\Delta к$ и заряд. Δq.

каждый из этих маленьк. зарядов создаёт электрич. поле, кот. опред. как поле точечн. заряда.

$\Delta E = \frac{k\Delta q}{r^2}$, где r - расстоян. от заряда Δq.

По принципу суперпозиции. $\vec{E_0} = \Delta\vec{E_1} + \Delta\vec{E_2} + \dots + \Delta\vec{E_n}$

Векторно складывая маленькие поля ΔE заметим, что горизонтальн. состав. поля 1 заряда "убивается" горизонт. состав. поля диаметр. противоположн. заряда для всех Δq. Получается E_0 имеет только вертик. проекцию и складыв. из вертик. проекций полей ΔE.

т.е. по прин. Суперпоз. Oy: $E_0 = \Delta E_1 \cos\alpha + \Delta E_2 \cos\alpha + \dots + \Delta E_n \cos\alpha$,

где α - угол между вертик. и вектором поля ΔE, направл. к отрицат. заряду Δq.

Р.с. $E_0 = \sum \Delta E \cdot \cos\alpha = \cos\alpha \sum \Delta E = \cos\alpha \sum \frac{k\Delta q}{r^2} = \cos\alpha \frac{k q_к}{r^2}$

т.к. по усл. $h = R$, а $r = \frac{R}{\sin\alpha}$, то $E_0 = \frac{k q_к \cos\alpha \sin^2\alpha}{R^2}$.

$E_0 = \frac{kq_к}{R^2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{4} = \frac{\sqrt{2}\, kq_к}{4R^2}$. т.к. $h = R$, то $\cos\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$.



$\alpha = 45°$. ЧИСТОВИК

т.к $E_0 = \frac{\sqrt{2}}{4} \frac{kq_к}{R^2}$, то $F_э = E_0 q_б = \frac{\sqrt{2}\, kq_к q_б}{4R^2}$

т.к. $|q_к| = |q_б|$, то $F_э = \frac{\sqrt{2}\, kq^2}{4R^2}$ и напр. к. кольцу, т.к. бусинка притян. к кольцу

3). подставим найден. $F_э$. во 2ЗН. для бусинки в мом.

$mg + \frac{\sqrt{2}kq^2}{4R^2} = F_{упр.} = k' x_{max.} \Rightarrow k' = \frac{mg}{x_{max}} + \frac{\sqrt{2}kq^2}{4R^2 x_{max.}}$

$x_{max} = \frac{mg}{k'} + \frac{\sqrt{2}kq^2}{4R^2 k'}$

4). рассм. бусинку после мгновен. нейтрализ. кольца

т.к. кольцо нейтрал., то теперь $q_к' = 0$., т.е. нет

~~$F_э$~~ элект. поля для бусинки. $\Rightarrow$ нет $F_э$, действ. на бусинку., а т.к. $F_э$. пропала, то система вышла из равнов.

рассм. бусинку в произв. момент. движен.



по 2ЗН. Oy: $ma_y = -F_{упр.(y)} + mg$.

$ma_y = -k'x + mg$

$ma = \frac{mg}{x_{max}} x + \frac{\sqrt{2}kq^2}{4R^2 x_{max.}} x - mg$.

$a_y = \frac{-k'}{m} x + g$ $\quad a_y + \frac{k'}{m} x = g$.

$x = x_{max} \sin(\omega t + \varphi_0)$

$\vartheta = x_{max}\omega \cos(\omega t + \varphi_0)$

$\vartheta_{max.}$

$\omega^2 = \frac{k'}{m}$. $\quad \omega = \sqrt{\frac{k'}{m}}$.

б). $\vartheta_{max} = \omega x_{max}$. , x_{max} - удлинен. пружины в начальн. момент. т.к. в этот момент. $\vartheta(0) = 0$, а ускорен. максим.

$\vartheta_{max} = \sqrt{\frac{k'}{m}} \left(\frac{mg}{k'} + \frac{\sqrt{2}kq^2}{4R^2 k'} \right)$.

т.е. в начале бусинка в амплит.

4853068

Ислорыка

$v_{max} = \sqrt{\frac{k'}{m}}\left(\frac{mg}{k'} + \frac{\sqrt{2}q^2 \cdot \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}{4R^2k'}\right) = \sqrt{\frac{m}{k'}}g + \frac{\sqrt{2}q^2}{16\pi\varepsilon_0 R^2\sqrt{mk'}}$.

$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

$= \sqrt{\frac{9\cdot10^{-3}}{10}}\cdot 10 + \frac{\sqrt{2}\cdot 1\cdot 10^{12}}{16\cdot 3{,}14\cdot 9\cdot 10^{12}\cdot 4\cdot 10^{-2}\sqrt{9\cdot10^{-3}\cdot 10}} =$

$= 3\cdot10^{-2}\cdot 10 + \frac{\sqrt{2}\cdot 10^3}{16\cdot 3{,}14\cdot 9\cdot 4\cdot 10^{-2}\cdot 3\cdot 10^{-1}}$

$0{,}3 + \frac{\sqrt{2}\cdot 1000}{16\cdot 12\cdot 9\cdot 3{,}14} = \frac{0{,}3\cdot 8\cdot 9\cdot 3\cdot 3{,}14 + \sqrt{2}\cdot 125}{8\cdot 3\cdot 9\cdot 3{,}14} \approx 0{,}56\ \frac{м}{с}$

Ответ: $v_{max} = \sqrt{\frac{k'}{m}}\left(\frac{mg}{k'} + \frac{\sqrt{2}q^2\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}{4R^2k'}\right) = 0{,}56\ \frac{м}{с}$.

Вопрос. Гармоническими называют колебания, происходящие по закону синуса или косинуса. т.е. урав. для коорд. имеет вид. $x(t) = A\sin\omega t + B\cos\omega t + x_0$ где A и B - некоторые коэф., а x_0 - нач. полож. или, что то же самое $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$, где A - амплит., ω - цикл. частота, φ_0 - начальн. фаза колеб.

- Амплитуда - максимальное смещение тела, совер. колебан., относительно положения равновесия, т.е. такое расст. от пол. равн., где ускор. тела максим., а скорость равна 0. в форм. $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ — амплит.
- Фаза гармон. колебан. - аргумент. sin или cos. в урав. колеб движен. т.е. $x(t) = A\sin(\omega t + \varphi_0)$ — фаза колеб. фаза сост. из. начальн. фазы $\varphi_0 = \text{const}$. и измен. со врем. фазы ωt.

Ч. 3.1.

Источник 9



$AB = d$.

$n = 1{,}5$.

α.

1) Рассм. прохожд. луч. света, проходящ. через призму.

по закону Снелла.

для 1 преломл. $n_1' \sin\alpha_1 = n_2'' \sin\beta_1$

$\sin\alpha_1 = n \sin\beta_1$.

$\alpha_1 = n\beta_1$ т.к. углы малые

для 2 преломл.

$n \sin\beta_2 = \sin\alpha_2$.

$n\beta_2 = \alpha_2$ т.к. углы малые.



~~Из геометрии. $\alpha_1 - \alpha_2 = \varphi$.~~

~~φ - угол отклонения~~

$180 - \beta_1 - \beta_2 = 180 - \alpha$.

Из вписан. $\Delta H_1 C H_2$.

т.е. $\alpha = \beta_1 + \beta_2$. $\Rightarrow \beta_2 = \alpha - \beta_1$

~~$\varphi = n\beta_1 - n\beta_2 = n(\beta_1 - \beta_2)$.~~

~~$\varphi = n(\beta_1 - \beta_2)$~~ ~~$\frac{\varphi}{n} = \beta_1 - \beta_2$~~

~~$\alpha = \beta_1 + \beta_2$~~ ~~$\alpha = \beta_1 + \beta_2$~~

φ - угол смещен. от первонач. ~~напр.~~ напр. луча.

$\varphi = \alpha_2 = n\beta_2 = n(\alpha - \beta_1)$.

$\beta_1 = \frac{\alpha_1}{n} \Rightarrow \varphi = n\left(\alpha - \frac{\alpha_1}{n}\right)$.

~~$\frac{\varphi}{n} + \alpha = 2\beta_1$~~ ~~$\beta_1 = \frac{\frac{\varphi}{n} + \alpha}{2}$~~.

~~$\alpha = \beta_1 + \beta_2 = \frac{\frac{\varphi}{n} + \alpha}{2} + \beta_2$.~~

~~$\beta_2 = \alpha - \frac{\varphi}{n2} - \frac{\alpha}{2} = \frac{\alpha}{2} - \frac{\varphi}{2n}$~~

Из прям. $\Delta AH_1H'$

$\angle AH_1H' = 90 - \alpha$.

т.к. $\alpha_1 + 90 + 90 - \alpha = 180$. т.е. ~~$\alpha = \beta_1 + \beta_2 =$~~

то. $\alpha_1 = \alpha$ $\Rightarrow \varphi = n\left(\alpha - \frac{\alpha}{n}\right) = \alpha(n-1)$.

(Чистовик)

Т-е. ~~самые~~ самые крайние лучи из пучка. преломятся на φ относ. первонач. положения и карт. будет симметр. для верхн. пучки.

Из рисунка ~~лучи~~ пересек. пересекаться в т. К.

Расст. от. АВ до К = b.

Из геометр. $tg\varphi = \frac{d}{2b}$ Т.к φ - малый, то $tg\varphi = \varphi$.

$\varphi = \frac{d}{2b}$ $\alpha(n-1) = \frac{d}{2b}$ $\Rightarrow b = \frac{d}{2\alpha(n-1)}$.

$b = \frac{5}{2 \cdot 0{,}1(1{,}5-1)} = \frac{5}{2 \cdot 0{,}1 \cdot 0{,}5} = 50$ см.

Ответ: $b = \frac{d}{2\alpha(n-1)} = 50$ см.

Вопросы: • Закон отражения света:

1). Луч падающ., луч. преломлен. и перпендик. в точку падения, лежат в одной плоскости.

2) Угол падения равен. углу отражения.

• ~~Пример построен. в собер. линзе~~