

ЛОМОНОСОВ – 2013. МЕХАНИКА. 7 – 8 классы

Ответы; краткие решения и критерии оценки задач

1. Автомобиль новой модели на одном литре бензина проходит на $4\frac{1}{6}$ километра

больше, чем автомобиль старой модели. При этом расход бензина на 100 км у него на 2 литра меньше. Сколько литров бензина на 100 км расходует новый автомобиль?

Ответ: 6 литров.

Указания. Расход нового автомобиля равен x литров, расход старого равен $x + 2$ литра. Уравнение: $\frac{100}{x} - \frac{100}{x+2} = \frac{25}{6} \Leftrightarrow \frac{4(x+2-x)}{x(x+2)} = \frac{1}{6} \Leftrightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \Leftrightarrow x = -8; x = 6$.

Поэтому $x = 6$ литров.

2. Гаврила с Глафирай взяли стакан, заполненный до краев водой, и немного воды вылили в три формочки для льда, положив их потом в морозильник. Когда лед замерз, получившиеся три кубика положили обратно в стакан. Гаврила предсказал, что часть воды из стакана выльется, так как при замерзании лед расширился в объеме. Глафира же утверждала, что уровень воды будет ниже края стакана, так как часть плавающего льда будет выступать над поверхностью воды. Кто же прав и почему?

Ответ: Не прав никто. Вода будет заполнять стакан ровно до его краев.

Указания. Пусть V – объем воды в формочках. Тогда объем W льда в формочках можно определить из закона сохранения массы $V \cdot \rho_{\text{воды}} = W \cdot \rho_{\text{льда}}$. При плавании льда объемом W , погруженную в воду часть этого объема U , можно определить из условия плавания тел $U \cdot \rho_{\text{воды}} = W \cdot \rho_{\text{льда}}$. Очевидно поэтому, что $V = U$.

3. Школьники Чуков и Геков катаются на коньках с постоянными скоростями по замкнутому кругу беговой дорожки ледового стадиона. Если Чуков бежит по часовой стрелке, а Геков – против, то их встречи происходят в четыре раза чаще, чем происходят обгоны в случае, когда они бегут в одном направлении. Скорость одного из школьников равна 6 м/сек. Какова скорость другого?

Ответ: Либо 10 м/сек, либо 3,6 м/сек.

Указания. При движении навстречу время между встречами равно $t_1 = \frac{L}{V_1 + V_2}$, при

попутном движении времени между обгонами: $t_2 = \frac{L}{V_1 - V_2}$ (здесь L – длина одного круга, V_1, V_2

– скорости). По условию $\frac{t_2}{t_1} = 4$, поэтому $\frac{V_1 + V_2}{V_1 - V_2} = 4$, откуда $\frac{V_2}{V_1} = \frac{3}{5}$.

В условии не сказано, скорость кого дана. Поэтому или $\frac{6}{V} = \frac{3}{5}$ (тогда $V = 10$ м/сек),

или $\frac{V}{6} = \frac{3}{5}$ (тогда $V = 3,6$ м/сек).

4. В большой ящик Гаврила вложил 7 ящиков поменьше. После этого Глафира в какие-то из этих семи ящиков вложила ещё по 7 маленьких ящиков, а в какие-то не вложила ничего. Потом Гаврила в какие-то из пустых ящиков вложил по 7 ящиков, а в какие-то нет. Глафира снова повторила эту операцию и так далее. В какой-то момент непустых ящиков оказалось 34. Сколько при этом было пустых?

Ответ: 205.

Указания. Операция заполнения одного ящика увеличивает количество пустых ящиков на $7 - 1 = 6$ штук, а количество непустых – на 1. Значит, после заполнения n ящиков

(неважно, на каком этапе) их количество будет: пустых – $1 + 6n$ штук; непустых – n штук. Поэтому $n = 34$, и непустых ящиков будет $1 + 6 \cdot 34 = 205$.

5. Сосуд заполнен холодной водой. С этим сосудом проделывают следующую процедуру: отливают три четверти холодной воды и доливают до первоначального объема горячей водой. При этом температура воды в сосуде увеличивается на 24°C . После этого процедуру повторяют несколько раз: отливают три четверти объема воды и доливают до первоначального объема горячей водой (той же температуры).

А) За какое количество процедур температура воды в сосуде будет отличаться от температуры горячей воды на 3°C ?

Б) Возможно ли добиться того, чтобы температура воды в сосуде отличалась от температуры горячей воды ровно на 1°C ?

Ответ: А) $n = 4$; Б) невозможно.

Указания. Из уравнения баланса тепла:

$$t_1 - t_c = t_h - t_1 \Rightarrow 2t_1 = t_c + t_h \quad (1)$$

$$t_2 - t_1 = t_h - t_2 \Rightarrow 2t_2 = t_h + t_1 \Rightarrow t_2 = t_h + \frac{t_h + t_c}{2} \Rightarrow t_2 = \frac{t_c + 3t_h}{4} \quad (2)$$

$$\text{Аналогично } t_3 = \frac{t_c + 7t_h}{8} \quad (3)$$

...

$$t_n = \frac{t_c + (2^n - 1)t_h}{2^n} \Rightarrow 2^n = \frac{t_h - t_c}{t_h - t_n} \quad (4)$$

Из условия задачи и из (1) следует, что $t_h - t_c = 48$. Из (4) получим, что: А) $n = 4$; Б) невозможно.

Все задачи оценивались по следующим критериям:

20 баллов – правильное (не обязательно такое, как выше) решение и правильный ответ;

15 баллов – в основном верное решение и верный ответ, но имеются дефекты в обосновании;

10 баллов – решение в основном верное, но содержит вычислительные ошибки.